



L'ÉCOLE ARMÉNIENNE
SOURP HAGOP

ÉCOLE PRIMAIRE V. ET A. SARAFIAN
ÉCOLE SECONDAIRE PASTERMADJIAN

ՍՈՒՐԲ ՀԱԿՈՒՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐժԱՐԱՆ

Վ. ԵՒ Ա. ՍԱՐԱՖԻԱՆ ԵՄԽԱԿԹԱԿԱՆ
ԲԱՍՏՐՄԱՃԵԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱԿԱՆ

ANNEXE A

PLAN INDIVIDUEL POUR CHAQUE ÉLÈVE ANAPHYLACTIQUE

Nom de l'élève : _____ Photo
Nom de l'enseignant(e) : _____ de
Numéro la salle de classe : _____ Année : _____ l'élève
No d'ordonnance et instruction(s) du médecin : _____

Cet élève souffre d'une allergie constituant un danger de mort provoquée par : _____

Cet élève porte un bracelet MedicAlert. Oui Non

Symptômes possibles d'une réaction : _____

Plan d'action en cas d'urgence

- Étendre l'élève et lui administrer l'Epipen pendant au moins 10 secondes. Prendre note de l'heure à laquelle la première injection a été administrée. Ensuite, replacer l'Epipen (l'aiguille en premier) dans son étui et le remettre aux ambulanciers.
- **Composer 911.** L'élève doit être transporté immédiatement à l'hôpital en ambulance. Il ne doit y avoir aucune exception à cette règle. Demeurer avec l'élève jusqu'à ce que l'ambulance arrive.
- Donner du Benadryl si prescrit. **Ne jamais essayer** de mettre quelque chose dans la bouche d'une personne qui n'est pas complètement consciente.

Si les symptômes empiront ou ne s'améliorent pas, administrer une deuxième dose d'Epipen 10 à 20 minutes après la première injection.

Médicament d'urgence	Où se trouve-t-il ?	Date d'expiration
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Nous recommandons fortement que chaque élève porte toujours un Epipen dans une sacoche de ceinture, et qu'un deuxième Epipen soit gardé au bureau de l'école.

Communiquer avec :

Mère

Nom : _____

Tel : _____

Père

Nom : _____

Tel. : _____

Autres personnes avec qui on peut communiquer :

Nom : _____

Nom : _____

Tel.: _____

Tel. _____